

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N°
du 136
24 Janvier 1989


- : - Ne pas confondre taille et mutilation :
- : - La lutte contre l'esca et l'excoriose est à :
- : envisager dès maintenant :
- : - Déjà, des descentes de chenilles processionnaires :
- : du pin :

Bien tailler c'est

- limiter le nombre de grosses plaies. Si une grosse plaie est nécessaire, on "parera" la coupe en lissant la surface à l'aide d'une serpette et en badigeonnant immédiatement avec une peinture antiseptique ou fongicide.

- éviter les chicots, départs de pourrissement du bois


- éviter les coupes trop rases = le rabottage sur un oeil ne doit pas être effectué trop près de l'oeil ... le rabottage d'un rameau ou d'une branche sur la branche porteuse ne doit pas mutiler les rides à l'insertion du rameau à enlever.




1. Coupe ou entaille sous la branche.
2. Coupe par le dessus, située vers l'extérieur par rapport à 1. La branche casse dans le fil du bois lorsque la coupe 2 arrive au niveau de 1. Pas d'arrachement, la branche tombe droit, sans pivoter.
3. Ablation du reste de la branche, sans risque d'arrachement.

Coupe correcte pour éviter l'arrachement

Coupe d'une branche de fort diamètre.



COUPE CORRECTE : à proximité d'un tire-sève, dans un plan parallèle à la ride de l'écorce, sans l'entamer.



Coupe correcte : en biseau, le haut de la coupe arrivant au niveau du haut de l'oeil et le bas de la coupe au niveau de sa base. La coupe ne doit pas être trop biseautée.

Rabattage d'une branche. Rabattage d'un jeune rameau

Dessins extraits de "l'élague et la taille des arbres d'ornement" G. MICHAU IDF.

VIGNE

*** Esca

Cette maladie reste toujours préoccupante , et la lutte entreprise doit être poursuivie deux ou trois années de suite.

Dans les parcelles atteintes, la seule matière efficace est l'arsénite de soude à 1250 g/hl (PYRALESCA RS, PYRAL REP FORT, PYRALUMNOL 2000)

- Intervenir par temps sec et sans vent
- Traiter au minimum 10 jours après la taille et au plus tard dès les premiers signes de gonflement des bourgeons les plus précoces.

:	:	
:	Bien mouiller toutes les plaies de taille	:
:	:	:

Il existe des appareils munis de panneaux récupérateurs qui permettent d'économiser les 2/3 de la bouillie . (on fait 3 ha au lieu d'1 ha sans les panneaux avec la même quantité de liquide).

*** Excoriose

Reconnaissable actuellement aux crevasses noires, qui affectent le bois, au blanchiment des écorces et à la présence de points noirs ou pycnides, cette maladie est présente dans notre région mais affecte un nombre limité de pieds.

Utilisez de l'arsénite de soude à la dose de 625 g/hl et le plus près possible du débourrement.

:	:	
:	l'arsénite de soude est très toxique	:
:	Soyez très prudents en le manipulant	:
:	:	:

PINS

Le temps très doux a permis la sortie des premières chenilles processionnaires . Leur descente a été observée en MARANA.

Actuellement vous pouvez entourer le tronc d'un anneau de glu de 30 à 40 cm sur lequel de nombreuses chenilles viendront s'agglutiner et mourir.